



Aktualizace Metodiky použití DRG markerů pro onkologii

i Víte o tom, že byla aktualizována METODIKA UŽITÍ DRG MARKERŮ V SYSTÉMU CZ-DRG – specifické pokyny pro kódování DRG markerů **pro onkologii** – upřesňující metodický materiál projektu DRG Restart? V brzké době bude také vyvěšena.

Movember - měsíc knírů

Ti, kteří si nechávali během měsíce listopadu **narůst knír upozorňující na důležitost mužského zdraví**, si na konci měsíce tuto připomínku, kterou měli všichni na očích, jednoduše oholili...

Naším a určitě i Vaším přáním je, aby se příklady níže (které jsou uvedeny v Metodice DRG markerů) kódovaly co nejméně.

Příklad 3.2.

Pacient přijat pro podezření na zhoubný novotvar prostaty, provedena zobrazovací vyšetření a biopsie prostaty. Po dvou dnech pacient propuštěn domů. Zhoubný novotvar prostaty potvrzen jako stadium II, Gleasonovo skóre rovno 7 (pro pětistupňový systém platný pro ZN prostaty kódujeme kódem G2 dle převodní tabulky 3.1).

Kódování:

HDG: C61 - Zhoubný novotvar prostaty

DRG marker pro klinické stadium: 91992 - (DRG) KLINICKÉ STADIUM ZHOUBNÉHO NOVOTVARU II

DRG marker pro stupeň diferenciacce: 91982 - (DRG) STŘEDNĚ (MÍRNĚ) DIFERENCOVANÝ ZHOUBNÝ NOVOTVAR - odpovídá označení G2

Příklad 3.5.

Pacient operován pro tumor prostaty v r. 2015, provedena roboticky asistovaná prostatektomie. Po dvou letech pacient přijat pro recidivu onemocnění v oblasti pánve, zjištěny metastázy v regionálních mízních uzlinách, což odpovídá dle TNM 8 klinickému stadiu IV.

Kódování:

HDG: C61 - Zhoubný novotvar prostaty

DRG markery pro klinické stadium a stupeň diferenciacce nekódujeme, jedná se o léčbu recidivy, nikoliv primárního onemocnění.

Zdroj: CZ-DRG Metodika DRG markerů - onkologie v. 1 (z 15. 11. 2018)

Na webu MKN-kódování během listopadu visela aktualita právě na toto téma a **všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili, děkujeme**. Více naleznete na cz.Movember.

